

Beltox[®] C

Uso veterinário
Carrapaticida e mosquicida
para pulverização de bovinos e equinos.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEQUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA.
BOVINOS, EQUINOS:
ABATE: CARÊNCIA ZERO.
LEITE: CARÊNCIA ZERO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

FÓRMULA

Cada 100mL contém:
Cipermetrina..... 15,0 g
Veículo q.s.p..... 100,0 mL

Indicações

Carrapaticida - Elimina larvas e ninfas do *Boophilus microplus*, *Amblyomma cajennense* e *Dermacentor nitens*.
Mosquicida e Repelente - Age contra moscas adultas vetores da *Dermatobia hominis* (mosca do berne), *Stomoxys calcitrans* (mosca do estábulo) e *Musca domestica* (mosca doméstica), permitindo um controle preventivo das infestações por berne em bovinos.
Larvicida e Repelente - Age preventivamente contra infestações por larvas do 1º instar da *Dermatobia hominis*.

Posologia

Bovinos: 20mL de Beltox C para 20 litros de água.
Equinos: 20mL de Beltox C para 10 litros de água.

Modo de usar

Uso externo em pulverização: medir a quantidade de Beltox C indicada na posologia e fazer uma pré-mistura em um balde com a quantidade de água (2 a 4 litros). Agitar cuidadosamente até formar uma mistura homogênea e transferir para um pulverizador. Continuar a agitação completando o volume desejado de água e fazer a pulverização dos animais a serem tratados, utilizando uma quantidade mínima de 5 litros por animal adulto. Pode ser usado qualquer tipo de pulverizador, manual ou mecânico, tendo o cuidado de observar a pressão adequada do jato para que haja penetração sob o pelo do animal, principalmente nas partes mais comumente infestadas: cabeça, pavilhão auricular interno (tendo cuidado para que o produto não penetre no ouvido), tábua de pescoço, entre as pernas, patas, região do períneo e base da cauda.

Importante:

As sobras das diluições poderão ser jogadas nas baias e locais onde os animais ficam por mais tempo, procurando atingir as frestas, cantos de paredes descascadas, etc.

Frequência das aplicações

Bovinos: inicialmente deve-se repetir as pulverizações a cada 21 dias, para ajudar a reduzir a infestação das pastagens. Após conseguir esta redução, espaçar as aplicações fazendo-as em intervalos mínimos de 30 dias.

Equinos: Repetir as pulverizações com Beltox C a cada 7 dias até reduzir drasticamente o *Amblyomma cajennense*.

Precauções de uso

Por ser à base de piretróide sintético, o Beltox C apresenta baixa toxicidade para o homem e animais, quando utilizado de acordo com as indicações e observando as precauções de uso: evitar inalação, aspiração ou contato do produto com os olhos, nariz, boca e pele. Caso isto ocorra, remover o paciente para um local arejado, lavar as partes atingidas com bastante água e sabão e chamar um médico imediatamente. • Manter o produto em sua embalagem original hermeticamente fechada, em local seco e fresco, ao abrigo da umidade e da luz solar direta. • Manipular o produto e suas diluições em locais arejados. Não fazer as aplicações contra o vento para não haver aspiração do produto.

• Não comer, beber ou fumar durante a manipulação e aplicação do produto. • Não fazer as pulverizações nos horários de calor intenso. Utilizar somente equipamentos em perfeito estado de conservação, sem vazamento. Não desentupir-los com a boca. • Não aplicar ou guardar o produto junto de alimentos, medicamentos, bebidas, produtos de higiene e de uso doméstico. Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos. • Não reaproveitar as embalagens vazias. • Não jogar restos do produto, suas diluições e embalagens vazias em lagos, rios, açudes, fontes ou tanques d'água.

• Se ingerido pode ser fatal. Em caso de ingestão recente, provocar vômito e procurar um médico imediatamente, levando a embalagem do produto. Se houver perda de consciência, não dar nada por via oral ao paciente.

Informações ao médico veterinário

O produto pertence à classe dos piretróides sintéticos e atua sob o sistema nervoso central. É hipersensibilizante e irritante de mucosas e deve ser feito um tratamento sintomático do colapso. Sintomas de alarme (intoxicação aguda): sudorese, salivação excessiva, respiração ofegante e rápida, depressão, náuseas, vômitos, hiperexcitação com convulsão.

Apresentações

Frascos de vidro contendo 20mL, 100mL ou 500mL, caixa coletiva contendo 25 frascos de 20mL e frascos plásticos contendo 250 e 1.000mL.

Conservação: Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação de médico veterinário.
Licenciado no Ministério da Agricultura sob o número 3897 em 07/01/92.
Responsável Técnico: Gustavo Henrique S. M. Neves - CRMV-MG 11.729



EB0254-F



CUIDADO
VENENOSO!

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:
Indubras Indústria Veterinária S/A.
R. João Rosa, 80 - GP 01 - Chácara Califórnia
CEP: 32.042-580 - Contagem / MG
Fone: (31) 3396 7333 - Fax: (31) 3396 7433
CNPJ: 18.365.734/0001-30 - Insc. Est.: 186.737.837-0013
INDÚSTRIA BRASILEIRA @ MARCA REGISTRADA
indubras@indubras.vet.br - www.indubras.vet.br



indubras
Indústria Veterinária