

# Provermin<sup>®</sup> Plus

Uso Veterinário

Vermicida - Larvicida - Ovicida

**ATENÇÃO:**  
ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER FORNECIDO PARA EQUINOS  
PRODUTORES DE CARNE PARA O CONSUMO HUMANO.

## FÓRMULA:

Cada 100 g contém:

Fembendazol ..... 14,6 g  
Triclorfon ..... 43,9 g  
Excipiente q. s. p. .... 100,0 g

## INDICAÇÕES:

Anti-helmíntico oral de largo espectro para equinos, altamente eficaz no tratamento e controle de verminoses gastrointestinais causadas por nematódeos (ovos, larvas e adultos): *Strongyloides spp.*, *Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Strongylus equinus*, *Parascaris equorum*, *Oxyuris equi*, *Cyathostomum sp.*, *Cylicocyclus sp.*, *Cylicostephanus spp.*, *Cylicodontophorus sp.*, *Cyalocephalus spp.* e *Gasterophilus sp.*

## MODO DE USAR E POSOLOGIA:

Uso oral: administrar através da seringa graduada, girando o anel da mesma e fixando-o na graduação do êmbolo de acordo com a dose indicada para o animal a ser tratado. Inserir a seringa lateralmente na boca do animal, em direção ao fundo da cavidade oral e pressionar o êmbolo, liberando o produto sobre a língua.

Observar se não contém restos alimentares na boca do animal (feno, capim ou ração), para que não haja perda do medicamento. A dosagem indicada é de 7,5 mg de fembendazol por kg de peso e 22,5 mg de triclorfon por kg de peso, em dose única, conforme a tabela abaixo:

Peso	Dosagem
Até 100 Kg	5,2 g
Até 200 Kg	10,3 g
Até 300 Kg	15,4 g
Até 400 Kg	20,5 g
Até 500 Kg	26,0 g

## CONTRAINDICAÇÕES:

O produto não deve ser administrado em fêmeas no último terço de gestação, em animais com idade inferior a 4 meses, em animais cansados, estabulados, debilitados por doenças graves, acometidos por diarreia infecciosa ou portadores de lesões hepáticas.

## INFORMAÇÕES PARA O MÉDICO:

Produto inibidor da acetilcolinesterase.

Antídoto: sulfato de atropina à 1%, por via intramuscular, na dosagem de 8 a 10 mL.

## PERÍODO DE CARÊNCIA:

Este produto não deve ser fornecido para equinos produtores de carne para o consumo humano.

## APRESENTAÇÃO:

Seringa plástica graduada contendo 26 g de pasta.

## PRECAUÇÕES DE USO:

Provermin Plus é uma associação do fembendazol e triclorfon, organofosforado de toxicidade média. Não apresenta problemas de toxicidade quando usado dentro das especificações e observando as precauções de uso:

- Manter os animais sob uma dieta verde, doze horas antes e após o tratamento. Evitar rações, grãos, concentrados vitamínicos e/ou minerais neste período;
- Não dar de beber ao animal após a administração do produto;
- Evitar contato do produto com os olhos, nariz, boca e pele. Se isto ocorrer, lavar as partes atingidas com bastante água e sabão, e caso apresentar algum sintoma, procurar imediatamente um médico veterinário;
- Manipular cuidadosamente o produto e mantê-lo em sua embalagem original, fechado hermeticamente, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta, fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reaproveitar as embalagens vazias e nem jogá-las em lagos, rios, açudes, fontes ou tanques de água;
- Não comer ou beber durante a administração do produto;
- Qualquer alteração na posologia e modo de usar fica a critério do médico veterinário.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 4.676/94 em 07/06/1994.

Responsável Técnico: Gustavo Henrique S. M. Neves - CRMV-MG 11.729

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:



Indubras Indústria Veterinária S/A.  
Rua João Rosa, 80 - GP 01 - Bairro Chácara Califórnia - CEP: 32 042-580 - Contagem - MG  
Fone: (0XX) 31-3396-7333 - Fax: (0XX) 31-3396-7433  
CNPJ: 18.365.734/0001-30 - Insc. Est.: 186.737.837-0013  
INDÚSTRIA BRASILEIRA @ MARCA REGISTRADA  
E-mail: indubras@indubras.vet.br - Site: www.indubras.vet.br

EB0234-F