

SARNEN® Suspensão

USO VETERINÁRIO



Existem vários tipos de sarnas, entre elas a Sarcóptica, causada pelo *Sarcoptes scabiei* var *canis*, chamada também de Escabiose, que ocorre com maior frequência nos cães e pode atingir o homem. O contágio ocorre na passagem do parasita de um animal com a sarna para outro animal sadio. Pode atingir o homem através de roupas, lençóis e outros objetos que tenham entrado em contato com o animal parasitado. O ambiente no qual o animal vive também fica infestado.

A Escabiose se caracteriza por intensa coceira e manchas avermelhadas na pele, que com o tempo se tornam úmidas e há formação de crostas. Os pelos ficam arrepiados e caem.

As regiões mais infestadas no cão são a cabeça e a parte interna dos membros, podendo atingir todo o corpo do animal.

COMPOSIÇÃO

Cada 100 mL contém:

Benzoato de benzila.....20,00g
Tirotricina.....0,05g
Veículo q.s.p.....100,00 mL

INDICAÇÃO

No tratamento das infestações por sarna sarcóptica (escabiose) em cães.

DOSAGEM E MODO DE USAR

Uso Externo: após banhar o animal, esfregar a região afetada com Sarnen Suspensão, utilizando esponja ou escova. Caso utilize a embalagem com válvula spray, basta pressioná-la direcionando o jato para a região afetada, evitando olhos, nariz, boca e mucosas. Não enxaguar. Deixar secar naturalmente, impedindo o animal de se lamber, pois o produto pode ser tóxico. Em caso de infestação nas orelhas, tomar cuidado para que o produto não entre no ouvido. O tratamento deve ser repetido diariamente, durante 2 semanas, ou a critério do médico veterinário.

Se após 10 dias de tratamento não houver melhora, retorne ao veterinário, levando consigo a embalagem do produto.

Controle: o melhor método para evitar a disseminação da sarna é:

- * Separar os animais doentes dos sadios e iniciar imediatamente o tratamento.
- * Desinfetar o ambiente, retirando entulhos em geral.
- * Forros e cobertas usadas pelo animal devem ser fervidos e guardados até o fim do tratamento. Durante o tratamento, permitir somente que o animal durma sobre forração de jornal que deve ser trocada diariamente e posteriormente queimada.
- * Usar luvas durante o tratamento, pois este tipo de sarna pode ser transmitida ao homem.
- * Animais fracos só devem ser tratados com acompanhamento veterinário.

PRECAUÇÕES GERAIS

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Não usar a embalagem vazia. Não guardar ou aplicar junto a alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e utensílios domésticos.

Não coma, não beba e não fume durante o manuseio do produto. Não utilize equipamento com vazamento. Não desentupa bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não manuseie o produto com as mãos desprotegidas. Não aplique o produto contra o vento. Não contamine coleções de água de qualquer natureza. Descartar, as embalagens vazias e restos de produto, bem como limpar os equipamentos ou recipientes usados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente.

CUIDADOS NO MANUSEIO DO PRODUTO

O produto é irritante para os olhos. Use protetor ocular. Ocorrendo contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente. Produto perigoso se inalado ou aspirado. Use máscaras cobrindo o nariz e a boca. Caso haja inalação ou aspiração, procure local arejado. Produto irritante e/ou absorvível pela pele. Use luvas de borracha, macacão com mangas compridas, avental impermeável e botas. Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente.

CONTRAINDICAÇÕES

Não deve ser utilizado em gatos. Não usar em animais sensíveis aos componentes da fórmula.

EFEITOS COLATERAIS

É irritante aos olhos, boca, nariz e mucosas.

Se durante o tratamento o animal apresentar salivação abundante e vômitos, suspenda o tratamento e procure o médico veterinário.

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do médico veterinário.

OBSERVAÇÕES

Classe: acaricida.

A ingestão oral pode causar estimulação do Sistema Nervoso Central e convulsões. Não há um antídoto específico, em caso de intoxicação o tratamento deve ser sintomático.

No caso de intoxicação humana, procurar auxílio médico imediatamente, levando a embalagem do produto.

APRESENTAÇÃO

Frasco plástico contendo 60 mL ou frasco plástico com válvula spray contendo 120 mL.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 3.113, em 21/12/88.

Responsável Técnico: Gustavo Henrique S. M. Neves - CRMV-MG 11.729



Proprietário e Fabricante: Indubras Indústria Veterinária S/A.
Rua João Rosa, 80 - GP 01 - Bairro Chácara Califórnia - CEP: 32 042-580 - Contagem - MG
CNPJ: 18.365.734/0001-30 - Insc. Est.: 186.737.837-0013
Fone: (0XX) 31-3396-7333 - Fax: (0XX) 31-3396-7433 - www.indubras.vet.br - indubras@indubras.vet.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA @ MARCA REGISTRADA

EB0119-H