

Beltox[®] C

USO VETERINÁRIO

Carrapaticida e mosquicida
para pulverização de equinos.

**ATENÇÃO: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER FORNECIDO PARA
EQUÍDEOS PRODUTORES DE CARNE PARA O CONSUMO HUMANO.**

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:
Cipermetrina..... 15,0 g
Veículo q.s.p..... 100,0 mL

INDICAÇÕES:

Carrapaticida: indicado no tratamento de infestações por larvas e ninfas do *Amblyomma cajennense*, *Dermacentor nitens* e *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.

Mosquicida e Repelente: indicado no tratamento de infestações por moscas adultas vetores da *Dermatobia hominis* (mosca do berne), *Stomoxys calcitrans* (mosca do estábulo) e *Musca domestica* (mosca doméstica).

Larvicida e Repelente: indicado no tratamento de prevenção contra as infestações por larvas do primeiro estágio da *Dermatobia hominis* (mosca do berne).

MODO DE USAR:

Equinos: 20 mL de Beltox[®] C para 10 litros de água. Uso externo. Aplicar por pulverização sobre os animais usando o pulverizador manual ou motorizado, atingindo todo o corpo do animal e certificando que o jato do pulverizador tenha pressão suficiente para penetrar debaixo dos pelos onde ficam alojados os parasitas. Quantidade mínima de 5 litros por animal adulto. As sobras das diluições poderão ser jogadas nas baias e locais onde os animais ficam por mais tempo, procurando atingir as frestas, cantos de paredes, entre outros.

FREQUÊNCIA DAS APLICAÇÕES:

Após a primeira aplicação, repetir as pulverizações com Beltox[®] C a cada 7 dias.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

Beltox[®] C apresenta baixa toxicidade para os animais e para o homem. Manter longe do alcance de crianças e de animais domésticos. Pode ser irritante para a pele e olhos. Lave as mãos após o uso e caso o produto entre em contato com a pele lave imediatamente com água e sabão. Caso ocorra contato com os olhos, lave-os imediatamente com água limpa e corrente. Em caso de ingestão por seres humanos, contate um médico imediatamente. Caso sejam observadas quaisquer alterações no seu animal após o tratamento com Beltox[®] C informe o médico veterinário. Manter o produto em sua embalagem original hermeticamente fechada, em local seco e fresco, ao abrigo da umidade e da luz solar direta.

INFORMAÇÕES AO MÉDICO VETERINÁRIO:

O produto pertence a classe dos piretróides sintéticos e atua sob o sistema nervoso central. Sintomas de alarme (intoxicação): sudorese, salivação excessiva, respiração ofegante e rápida, depressão, náuseas, vômitos e hiperexcitação com convulsão.

APRESENTAÇÃO:

Frascos contendo 20 mL, 100 mL ou 500 mL. Caixa coletiva contendo 25 frascos de 20 mL e frascos plásticos contendo 250 mL e 1000 mL.

Importante:

As sobras das diluições poderão ser jogadas nas baias e locais onde os animais ficam por mais tempo, procurando atingir as frestas, cantos de paredes descascadas, etc.

Conservação:

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do médico veterinário.

Licenciado pelo Mapa desde 07/01/1992.

Registrado sob o nº MG 000078-7.000006.

Responsável técnico: Gustavo Henrique S. M. Neves - CRMV-MG 11.729.



Proprietário e Fabricante:
Indubras Indústria Veterinária S/A
Rua João Rosa, 80 | GP 01 | Contagem - MG
Bairro Chácara Califórnia | CEP: 32.042-580
CNPJ: 18.365.734/0001-30
Fone: (31) 3396-7333 | www.indubras.vet.br
INDÚSTRIA BRASILEIRA ® MARCA REGISTRADA

EB0284-G

Medida: 80x118 mm